



الجمهورية اليمنية
جامعة صنعاء
نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
كلية الطب والعلوم الصحية
قسم امراض القلب

نمط أمراض القلب المرقدة في قسم باطنية القلب – مركز القلب-مستشفى الثورة-مدينة صنعاء

رسالة مقدمة من

سناء حمود السفيناني

الى قسم امراض القلب، كلية الطب والعلوم الصحية، لاستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في
طب امراض القلب والأوعية الدموية

المشرف الرئيس

أ.د/ محمد محمد الكبسي

أستاذ مشارك باطنية القلب

كلية الطب والعلوم الصحية

جامعة صنعاء

المشرف المشارك

د. أحمد العنسي

أستاذ مساعد باطنية القلب

كلية الطب والعلوم الصحية

جامعة صنعاء

ديسمبر، ٢٠٢٣ م

صنعاء

جمادى الاولى، ١٤٤٥ هـ



ملخص الدراسة

خلفية الدراسة: في الوقت الحالي، ترتفع أمراض القلب والأوعية الدموية في العالم وتتطلب اهتمامًا كبيرًا لأن العواقب لا تقتصر على الممرضة والوفيات فحسب، بل تمثل أيضًا عبئًا اقتصاديًا كبيرًا. ومع ذلك، يبدو أنه لم يتم دراسة أنماط الأمراض القلبية في اليمن بشكل جيد. لذلك، هدفت الدراسة الحالية إلى وصف الأمراض القلبية الوعائية والأمراض المصاحبة بين المرضى المقبولين في قسم أمراض القلب في مركز القلب في مستشفى الثورة، في صنعاء.

منهجية الدراسة: هذه الدراسة هي دراسة وصفية مقطعية أجريت بين نوفمبر ٢٠٢١م إلى مايو ٢٠٢٢م وشملت ٢٣٨ مريضًا. تم تضمين جميع المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الذين ظهرت عليهم الأعراض والعلامات. تم جمع البيانات الاجتماعية والديموغرافية والعادات الشخصية والأدوية والفحص البدني وتخطيط كهربائية القلب وتخطيط صدى القلب وضغط الدم والبيانات البيوكيميائية وبيانات الدم من المشاركين في الدراسة.

النتائج: أظهرت النتائج أن ٦٥,١٪ من المشاركين كانوا ذكورًا. كان متوسط عمر المرضى ٥٤,٦ (±١٥,٣) عامًا. كان معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري ٣٣,٢٪ و ٢٩٪ على التوالي. كان داء القلب الإقفاري (٤٢,٤٪)، وأمراض القلب الروماتيزمية (١٤,٣٪)، واعتلال عضلة القلب التوسعي (١٢,٢٪) أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا. لم تكن هناك فروق ذات دلالة احصائية في العمر بين الرجال والنساء (٥٥,٦ مقابل ٥٢,٧ سنة على التوالي، القيمة الاحتمالية = ٠,١٩٧)؛ ومع ذلك، كان استبدال الصمام المعدني أكثر شيوعًا بين النساء منه بين الرجال (١٠,٨٪ مقابل ٣,٩٪ على التوالي، القيمة الاحتمالية =



الجمهورية اليمنية

جامعة صنعاء

نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

في الأندلس اللوجستي متعدد المتغيرات، كان كل من الجنس الأثنوي

كلية الطب والعلوم الصحية

الأرقحيم الملهن أفتب

٣,٦٥؛ فترة ثقة ٩٥٪ = ١,٢٩ - ١٠,٣١، القيمة الاحتمالية = ٠,٠١٤) والخضوع لاستبدال الصمام المعدني (نسبة الأرجحية المعدلة = ٤,١٨؛ فترة ثقة ٩٥٪ = ١,٠١ - ١٦,٤٤، القيمة الاحتمالية = ٠,٠٤٠) متنبئات مستقلة للوفاة بين المرضى.

الاستنتاجات والتوصيات: كانت أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض القلب والأوعية الدموية، واعتلال عضلة القلب التوسعي هي أكثر ثلاثة أمراض قلبية شيوعًا بين المشاركين في هذه الدراسة. إن اتباع المبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن علاج عوامل الخطر سيساعد على تقليل معدلات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والوفيات.

ديسمبر، ٢٠٢٣ م

صنعاء

جمادى الاولى، ١٤٤٥ هـ