

قائمة الأسئلة

علم الأدوية - المستوى الثاني - قسم جميع التخصصات - كلية الطب والعلوم الصحية - برامج العلوم الطبية التطبيقية - الفترة الثانية - درجة الامتحان (0)
د/ عدنان عبده حسين الأدهل

- 1) 1. The NSAID that is safe during pregnancy is:
- 1) - a) aspirin
 - 2) + b) paracetamol
 - 3) - c) ibuprofen
 - 4) - d) diclofenac
 - 5) - e) meloxicam
- 2) 2. The NSAID that is safe in peptic ulcer is:
- 1) - a) aspirin
 - 2) + b) paracetamol
 - 3) - c) ibuprofen
 - 4) - d) diclofenac
 - 5) - e) meloxicam
- 3) 3. The NSAID that is toxic to the liver in overdose is:
- 1) - a) aspirin
 - 2) + b) paracetamol
 - 3) - c) ibuprofen
 - 4) - d) diclofenac
 - 5) - e) meloxicam
- 4) 4. The NSAID that is used for the prevention of myocardial infarction is:
- 1) + a) aspirin
 - 2) - b) paracetamol
 - 3) - c) ibuprofen
 - 4) - d) diclofenac
 - 5) - e) meloxicam
- 5) 5. The NSAID that is used for the prevention of stroke is:
- 1) + a) aspirin
 - 2) - b) paracetamol
 - 3) - c) ibuprofen
 - 4) - d) diclofenac
 - 5) - e) meloxicam
- 6) 6. The NSAID that is contraindicated inpatients below 12 years old is:
- 1) + a) aspirin
 - 2) - b) paracetamol
 - 3) - c) ibuprofen
 - 4) - d) diclofenac
 - 5) - e) meloxicam
- 7) 7. The antihistamine that is used for motion sickness is:
- 1) - a) chlorpheniramine
 - 2) + b) diphenhydramine
 - 3) - c) cetirizine
 - 4) - d) meclizine
 - 5) - e) cyproheptadine
- 8) 8. The antihistamine that is used for morning sickness is:
- 1) - a) chlorpheniramine
 - 2) - b) diphenhydramine





- 3) - c) cetirizine
4) + d) meclizine
5) - e) cyproheptadine
- 9) 9. The antihistamine that is used for anaphylactic shock is:
1) + a) chlorpheniramine
2) - b) diphenhydramine
3) - c) cetirizine
4) - d) meclizine
5) - e) cyproheptadine
- 10) 10. The non-sedating antihistamine is:
1) - a) chlorpheniramine
2) - b) diphenhydramine
3) + c) cetirizine
4) - d) meclizine
5) - e) cyproheptadine
- 11) 11. The corticosteroid that is used for anaphylactic shock is:
1) + a) hydrocortisone
2) - b) budesonide
3) - c) betamethasone
4) - d) prednisolone
5) - e) triamcinolone
- 12) 12. The corticosteroid that is used for asthma as inhaler is:
1) - a) hydrocortisone
2) + b) budesonide
3) - c) betamethasone
4) - d) prednisolone
5) - e) triamcinolone
- 13) 13. The corticosteroid that is used mostly topically is:
1) - a) hydrocortisone
2) - b) budesonide
3) + c) betamethasone
4) - d) prednisolone
5) - e) triamcinolone
- 14) 14. The most common used oral corticosteroid is:
1) - a) hydrocortisone
2) - b) budesonide
3) - c) betamethasone
4) + d) prednisolone
5) - e) triamcinolone
- 15) 15. The most powerful corticosteroid is:
1) - a) hydrocortisone
2) - b) budesonide
3) - c) betamethasone
4) - d) prednisolone
5) + e) dexamethasone
- 16) 16. Muscle weakness is most likely occur as a side effect with the use of:
1) - a) diazepam
2) - b) baclofen
3) + c) dantrolene





- 4) - d) tizanidine
5) - e) orphenadrine
- 17) 17. Sedation is most likely occur as a side effect with the use of:
1) + a) diazepam
2) - b) baclofen
3) - c) dantrolene
4) - d) tizanidine
5) - e) orphenadrine
- 18) 18. Hypotension is most likely occur as a side effect with the use of:
1) - a) diazepam
2) - b) baclofen
3) - c) dantrolene
4) + d) tizanidine
5) - e) orphenadrine
- 19) 19. The best antispasticity drug among the following is:
1) - a) diazepam
2) + b) baclofen
3) - c) dantrolene
4) - d) tizanidine
5) - e) orphenadrine
- 20) 20. The antispasticity drug used for local muscle spasm due to strain or sprain is:
1) - a) diazepam
2) - b) baclofen
3) - c) dantrolene
4) - d) tizanidine
5) + e) orphenadrine
- 21) 21. The most common used opioid analgesic is:
1) - a) heroin
2) + b) morphine
3) - c) methadone
4) - d) naloxone
5) - e) naltrexone
- 22) 22. The opioid antagonist that is used for opioid overdose is:
1) - a) heroin
2) - b) morphine
3) - c) methadone
4) + d) naloxone
5) - e) naltrexone
- 23) 23. The opioid agonist that is used to replace morphine in opioid addicts is:
1) - a) heroin
2) - b) morphine
3) + c) methadone
4) - d) naloxone
5) - e) naltrexone
- 24) 24. The opioid antagonist that is used as long-term treatment of opioid addicts is:
1) - a) heroin
2) - b) morphine
3) - c) methadone
4) - d) naloxone





- 5) + e) naltrexone
- 25) 25. The most addictive opioid is:
1) + a) heroin
2) - b) morphine
3) - c) methadone
4) - d) naloxone
5) - e) naltrexone
- 26) 26. The best antibacterial used for typhoid is:
1) - a) amoxicillin
2) - b) doxycycline
3) + c) ciprofloxacin
4) - d) amikacin
5) - e) spiramycin
- 27) 27. The best antibiotic used for H pylori is:
1) + a) amoxicillin
2) - b) doxycycline
3) - c) ciprofloxacin
4) - d) amikacin
5) - e) spiramycin
- 28) 28. The best antibacterial used for urinary tract infection caused by Pseudomonas aeruginosa is:
1) - a) amoxicillin
2) - b) doxycycline
3) - c) ampicillin
4) + d) amikacin
5) - e) spiramycin
- 29) 29. The best antibacterial for cholera is:
1) - a) amoxicillin
2) + b) doxycycline
3) - c) ciprofloxacin
4) - d) amikacin
5) - e) spiramycin
- 30) 30. The best antibacterial for toxoplasmosis in pregnancy is:
1) - a) amoxicillin
2) - b) doxycycline
3) - c) ciprofloxacin
4) - d) amikacin
5) + e) spiramycin
- 31) 31. The antimicrobial agent used for bilharziasis is:
1) - a) nitazoxanide
2) - b) vancomycin
3) - c) acyclovir
4) - d) fluconazole
5) + e) praziquantel
- 32) 32. The antimicrobial agent used for viral infection is:
1) - a) nitazoxanide
2) - b) vancomycin
3) + c) acyclovir
4) - d) fluconazole
5) - e) praziquantel





33) 33. The antimicrobial agent used for fungal infection is:

- 1) - a) nitazoxanide
- 2) - b) vancomycin
- 3) - c) acyclovir
- 4) + d) fluconazole
- 5) - e) praziquantel

34) 34. The antimicrobial agent used for protozoal infection is:

- 1) + a) nitazoxanide
- 2) - b) vancomycin
- 3) - c) acyclovir
- 4) - d) fluconazole
- 5) - e) praziquantel

35) 35. The antimicrobial agent used for methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection is:

- 1) - a) nitazoxanide
- 2) + b) vancomycin
- 3) - c) acyclovir
- 4) - d) fluconazole
- 5) - e) praziquantel

