



قائمة الاسئلة

- (70) الحماية من الأشعة - المستوى الأول - قسم أشعة - كلية الطب والعلوم الصحية - برامج العلوم الطبية التطبيقية - الفترة الثانية - درجة الامتحان (70)
د/ جمال عبدالجليل محمد شمهان
- (1) تزيد الجرعة الإشعاعية كلما ابتعدنا عن المصدر المشع بحسب قانون التربيع العكسي .
1) TRUE -
2) FALSE +
- (2) حدود الجرعة المسموح بها للعاملين في أقسام الأشعة السينية التشخيصية هي بنفس حدود الجرعة المسموح بها للمرضى.
1) TRUE -
2) FALSE +
- (3) تصنف الموجات فوق الصوتية ضمن الأشعة الغير مؤينة لان ليس لها طاقة عالية قادرة على أحداث تأين في المادة.
1) TRUE +
2) FALSE -
- (4) يستعمل الرصاص في تدريع غرف الأشعة السينية لكثافته العالية وقدرته على توهين فوتونات الأشعة السينية
1) TRUE +
2) FALSE -
- (5) استخدام الأشعة السينية في التشخيص الإشعاعي يعتبر آمناً تماماً ولا ينطوي على أي مخاطر
1) TRUE -
2) FALSE +
- (6) تقع مسؤولية حماية المريض من التعرض للإشعاع على عاتق فني الأشعة
1) TRUE +
2) FALSE -
- (7) الوقاية الإشعاعية لا تعتبر ضرورية عند التعرض لجرعات منخفضة من الإشعاع
1) TRUE -
2) FALSE +
- (8) يتوجب على العامل الإشعاعي عدم إجراء أي فحص إشعاعي بدون طلب خطي من الطبيب.
1) TRUE +
2) FALSE -
- (9) يمكن حماية الإنسان من مخاطر الإشعاع من خلال اتباع إجراءات السلامة والوقاية.
1) TRUE +
2) FALSE -
- (10) الأشعة المؤينة لا يمكن اكتشافها او قياسها بأي وسيلة متاحة حالياً
1) TRUE -
2) FALSE +
- (11) الهدف من الوقاية الإشعاعية هو منع ظهور التأثيرات البيولوجية الحتمية والتقليل من ظهور التأثيرات العشوائية
1) TRUE +
2) FALSE -
- (12) الأشعة السينية المنتشرة من اثر كومبتون هو مصدر معظم التعرض للإشعاع المهني الذي يتلقاه المصورون بالأشعة.
1) TRUE +
2) FALSE -
- (13) لا توجد عتبة محددة لظهور التأثيرات العشوائية للإشعاع
1) TRUE +
2) FALSE -
- (14) التدريع يقلل من تأثير الأشعة المؤينة على العاملين والناس.
1) TRUE +
2) FALSE -
- (15) مسؤولية تدريع استخدام الأشعة السينية التشخيصية تقع على عاتق الطبيب
1) TRUE +
2) FALSE -





- 16 هل يمكن رؤية الإشعاع المؤين بالعين المجردة؟
- (1) - نعم، يمكن رؤيته بوضوح.
(2) - نعم، يمكن رؤيته بشكل ضبابي.
(3) + لا، لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.
(4) - يعتمد على نوع الإشعاع.
- 17 ما هو مبدأ تبرير الممارسة في أقسام الأشعة السينية التشخيصية؟
- (1) - تقليل تكلفة الفحوصات.
(2) - استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا.
(3) + موازنة الفائدة المرجوة من التشخيص أو المعالجة مع الضرر الإشعاعي الذي قد يقع.
(4) - تطبيق حدود الجرعة.
- 18 ما هي أقصى جرعة من الإشعاع يُسمح للعاملين في أقسام الأشعة السينية التشخيصية بالتعرض لها سنويًا؟
- (1) - 1 ملي سيفرت
(2) + 20 ملي سيفرت
(3) - 100 ملي سيفرت
(4) - لا يوجد حدود ، لكن هناك مستويات إرشادية
- 19 الأمثلة في التعرض الطبي يعني:
- (1) - عدم تعريض المريض الأشعة لتجنب ظهور الآثار البيولوجية الأشعة المؤينة.
(2) + أن الجرعة يجب أن تكون أخفض ما يمكن الحصول إليه بشكل منطقي وتؤخذ العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
(3) - موازنة الفائدة المرجوة من التشخيص أو المعالجة مع الضرر الإشعاعي الذي قد يقع.
(4) - تطبيق حدود الجرعة.
- 20 ما هو الحد الأقصى للجرعة المسموح بها لتعرض المرضى في أقسام الأشعة السينية التشخيصية سنويًا؟
- (1) - 1 ملي سيفرت
(2) - 20 ملي سيفرت
(3) - 100 ملي سيفرت
(4) + لا يوجد حدود ، لكن هناك مستويات إرشادية
- 21 تقاس الجرعة المكافئة بوحدة
- (1) - الجول (J)
(2) - البيكريل (Bq)
(3) - الجراي (Gy)
(4) + السيفرت (Sv)
- 22 ما هو تأثير الإشعاع على الجسم البشري؟
- (1) - يسبب زيادة في درجة الحرارة فقط.
(2) + يسبب تغيرات جينية وأمراض مثل السرطان.
(3) - لا يوجد تأثير على الجسم البشري.
(4) - يزيد من مستويات الطاقة فقط.
- 23 ما هي قواعد الوقاية الإشعاعية في التعرض الخارجي؟
- (1) - تقليل الوقت.
(2) - زيادة المسافة.
(3) - استخدام واقيات الرصاص.
(4) + جميع ما ذكر صحيح
- 24 ما هي مبادئ الوقاية من الإشعاع المؤين في التعرض الطبي؟
- (1) - التدريع ، المسافة ، الزمن .
(2) + تبرير الممارسة، الأمثلة، حدود الجرعة.
(3) - عدم التعرض الأشعة مهما كانت المبررات
(4) - تجنب التعرض للأشعة الغير المؤينة
- 25 ما هي أكثر الأعضاء حساسية للإشعاع المؤين؟
- (1) - العظام.
(2) - الجلد
(3) + الغدد التناسلية





- (4) - جميع أعضاء الجسم لها نفس الحساسية من الإشعاع المؤين .
(26) ما الذي يحدث للجرعة الإشعاعية الممتصة عند زيادة زمن التعرض للإشعاع؟
- (1) + زيادة
(2) - انخفاض
(3) - عدم تأثير الزمن
(4) - لا تتغير
- (27) ما هي الوقاية الإشعاعية؟
- (1) - استخدام الأشعة للحصول على صورة تشخيصية
(2) + حماية الأشخاص من التعرض الضار للإشعاع
(3) - استخدام المواد الكيميائية للتخلص من الإشعاع
(4) - تدريب الأشخاص على استخدام الأشعة
- (28) أي من الأشعة التالية لها قدرة أكبر على النفاذ (الاختراق) خلال المواد:
- (1) + الأشعة السينية
(2) - الضوء المرئي
(3) - الأشعة فوق البنفسجية
(4) - أشعة الفا
- (29) أي من أنواع الأشعة المبينة أدناه لا تعتبر من ضمن الأشعة المؤينة:
- (1) - جسيمات بيتا.
(2) - اشعة جاما.
(3) - الأشعة السينية.
(4) + الرنين المغناطيسي .
- (30) في حالة التعرض للأشعة المؤينة بانتظام على مدى زمن طويل (على سبيل المثال أشهر أو أعوام) يسمى ذلك:
- (1) - بالتعرض الإشعاعي الحاد acute exposure
(2) + بالتعرض الإشعاعي المزمن chronic exposure
(3) - النشاط الإشعاعي
(4) - التفكك الإشعاعي
- (31) أثناء إجراء التصوير الإشعاعي في التشخيص الإشعاعي :
- (1) + يتلقى المريض الموجود في حزمة الأشعة السينية الجرعة الإشعاعية الأعلى.
(2) - يتعرض العاملون الإشعاعين جرعة الإشعاعية أعلى من الجرعة التي يتلقاها المريض
(3) - يتعرض العاملون الإشعاعين والمريض لمقدار متساوي من الجرعة.
(4) - الجرعة الإشعاعية لأفراد الجمهور أعلى من الجرعة الإشعاعية للعاملين والمريض
- (32) إذا تجاوزت جرعة العامل 20 ملي سيفرت في السنة فما هو الاجراء المناسب اتخاذه في مثل هذه الحالة:
- (1) - يقدم استقالته وترك العمل فوراً.
(2) - فصله نهائياً من العمل .
(3) - يستمر العامل بالعمل ولا يتخذ أي اجراء صحيحي.
(4) + اتخاذ إجراءات لتصحیح الخلل وضمان عدم تجاوز تعرضه لجرعة أكثر من 100 ملي سيفرت للخمس سنوات.
- (33) ينبغي على المرأة العاملة في المجال الإشعاعي بمجرد علمها بحدوث حمل:
- (1) - تأخذ إجازة حتى تنتهي فترة الحمل
(2) - تقدم استقالتها وتترك العمل فوراً .
(3) - تمارس عملها بشكل طبيعي كما هو معتاد قبل علمها بالحمل.
(4) + ينبغي أن لا تزيد الجرعة على سطح بطن الحامل عن 1 ملي سيفرت خلال فترة الحمل.
- (34) تستخدم الأشعة فوق البنفسجية في
- (1) - الكشف عن الكسور في العظام.
(2) - تسخين الطعام.
(3) + تعقيم أدوات الجراحة حيث تقتل البكتيريا والفيروسات
(4) - نقل الأصوات وإشارة التلفزيون .
- (35) إذا حصل الإلكترون على طاقة غير كافية لاقتلعه من الذرة وارتفع الى مستوى طاقة أعلى تسمى هذه العملية
- (1) - التائين.
(2) + الإثارة





-
- (3) - النشاط الاشعاعي
(4) - التفكك الاشعاعي

